

TRABAJOS DE FIN DE GRADO OFERTADOS -GRADO EN FÍSICA- CURSO 2017-18

	TÍTULO	TUTOR	RESUMEN
1.	CARACTERIZACIÓN Y APLICACIONES DE LAS RADIACIONES NO IONIZANTES	ANA ANA GARCÍA FLORES	<p>Las radiaciones no ionizantes han despertado gran interés debido a sus posibles usos en el campo de la medicina (terapia y diagnóstico). Asimismo, en los últimos tiempos se ha incrementado el uso de equipamiento generador de este tipo de radiación (láser, microondas, telefonía móvil, etc.); tanto en el ámbito industrial como en el biomédico. Por otro lado, esto ha provocado que la preocupación en la sociedad se haya incrementado debido a los posibles efectos biológicos nocivos para los ciudadanos.</p> <p>Dada la heterogeneidad de las radiaciones incluidas dentro del grupo general de electromagnéticas no ionizantes, analizaremos los distintos tramos del espectro en forma individual centrándonos en el intervalo de las radiofrecuencias, intervalo en el que se sitúa la Imagen por Resonancia Magnética.</p>
2.	ESTUDIO DE UNA MEZCLA DE ESFERAS DURAS ADITIVAS CONFINADA	ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ	<p>Un fluido de esferas duras es el compuesto por partículas esféricas que no pueden interpenetrarse pero que carecen de cualquier otra interacción.</p> <p>Si todas las esferas tienen el mismo tamaño se habla de fluidos monocomponente, pero si hay varios tamaños se habla de mezcla de esferas duras. En este trabajo se pretende estudiar el comportamiento de una mezcla binaria de esferas duras confinada entre dos paredes duras planoparalelas. Se estudiarán tanto propiedades microscópicas (el perfil de densidad) como macroscópicas (adsorción), empleando tanto herramientas aproximadas de tipo teórico como de simulación por ordenador.</p>
3.	ESTUDIO DE LA TRANSICIÓN DE FASE LÍQUIDO-VAPOR EN EL FLUIDO DE LENNARD-JONES	ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ	<p>El potencial de interacción de Lennard-Jones es un modelo de potencial interpartícula muy utilizado en el estudio de fluidos, ya que recoge bastante bien las propiedades de los gases cuyas moléculas tienen simetría esférica, como los gases nobles. En particular, y a diferencia de otros modelos como las esferas duras, este potencial presenta una transición de fase líquido-vapor similar a la que se da en los fluidos simples reales. En este trabajo se empleará el método de simulación Montecarlo en la colectividad de Gibbs para estudiar las densidades en la coexistencia líquido-vapor para un fluido de Lennard-Jones. En particular se estudiará la influencia de cortar o no (<i>cut-off</i>) el potencial y cómo afecta al diagrama de fases.</p>
4.	SIMULACIÓN DE MOVIMIENTO DE CARGAS EN MATERIALES CONDUCTORES	LUIS LÓPEZ DÍAZ	<p>Cuando se introduce carga en un conductor ésta se redistribuye hasta alcanzar el equilibrio, situación en la cual toda la carga está colocada sobre la superficie de forma que el campo en el interior es nulo. Este proceso ocurre en un tiempo muy corto y es consecuencia de la interacción coulombiana entre las cargas. El trabajo que se propone consiste en estudiar este proceso en situaciones diversas y conductores con distintas geometrías. Para ello se elaborará un modelo que describa la dinámica de las cargas teniendo en cuenta la interacción electrostática entre ellas y se desarrollará un código que permita resolver numéricamente las ecuaciones dinámicas del sistema de cargas.</p>
5.	CONTROL DEL ESTADO DE NANOESTRUCTURAS MAGNÉTICAS A TRAVÉS DE SU GEOMETRÍA	EDUARDO MARTÍNEZ VECINO	<p>Recientes evidencias experimentales indican que las propiedades magnéticas de nanoestructuras magnéticas no sólo dependen del material ferromagnético con el que se las fabrica [1]. También dependen de la presencia de otros materiales no magnéticos sobre los que se deposita las nanoestructuras magnéticas. Pero no sólo eso, además es posible controlar la manera en la que se invierte el estado magnético simplemente manipulando la geometría de las nanoestructuras, lo cual sugiere expectativas sin precedentes para el diseño de dispositivos lógicos y memorias magnéticas entre otros. Sin embargo, las técnicas experimentales que permiten acceder al estado de la magnetización carecen de la resolución espacio temporal necesaria para entender y controlar dichos dispositivos. Es necesario por tanto, un estudio previo que permita elucidar los mecanismos responsables de dichos procesos, y el micromagnetismo computacional es la herramienta apropiada.</p>

TRABAJOS DE FIN DE GRADO OFERTADOS -GRADO EN FÍSICA- CURSO 2017-18

			El objetivo general del trabajo consiste en introducir al alumno en el formalismo micromagnético [2]. Una vez adquirida familiaridad con los fundamentos teóricos, aprenderá a utilizar un software micromagnético que permite estudiar una gran variedad de fenómenos relacionados con la dinámica de la magnetización a escala nanométrica. Posteriormente aplicaremos lo aprendido para caracterizar los estados magnéticos y los procesos de inversión de la magnetización a través de la geometría en sistemas biestables de interés tecnológico.
6.	OPTIMIZACIÓN TERMODINÁMICA DE CICLOS DE POTENCIA	JOSÉ MIGUEL MATEOS ROCO	Los ciclos reversibles de aire permiten modelizar de manera sencilla los procesos que tienen lugar en los convertidores de energía que utilizan un gas como fluido de trabajo. A partir del análisis termodinámico del ciclo reversible, el trabajo y el rendimiento del mismo pueden expresarse en términos de un conjunto reducido de parámetros, que permiten caracterizar el funcionamiento del convertidor energético. Tomando como punto de partida los ciclos reversibles, en el presente trabajo se propone extender esta modelización incluyendo la evaluación de las irreversibilidades inherentes a los procesos que tienen lugar en una planta de potencia real. El estudio del comportamiento de las diferentes funciones termodinámicas (energía consumida, trabajo, rendimiento etc...) en términos de los parámetros característicos del ciclo permitirá elegir diferentes criterios de optimización, y establecer los regímenes de funcionamiento óptimo previstos con cada criterio. De este modo los resultados obtenidos pueden servir de referencia tanto para el diseño como para la determinación de las condiciones de funcionamiento óptimo de plantas de potencia de gas reales.
7.	ESPECTROSCOPIA EN EL RANGO DE THZ	YAHYA MOUBARAK MEZIANI JESÚS E. VELÁZQUEZ PÉREZ	<p>El espectro electromagnético comprendido entre 0.1 y 10THz es conocido como rango de THz. La investigación en THz es uno de los temas de investigación más activos en Física e Ingeniería por sus numerosas aplicaciones en comunicaciones con anchos de banda superiores a 100Gbit/s, espectroscopía, imagen, inspección de objetos ocultos, etc. La espectroscopía de THz es una técnica nueva que permite identificar sustancias químicas con firmas propias en el rango de THz (por ejemplo, distinción entre isómeros, principios farmacéuticos activos, ...) y estudiar la dinámica ultrarrápida de electrones en semiconductores.</p> <p>En este trabajo se propone el estudio de diferentes materiales semiconductores usando el sistema de espectroscopía desarrollado por el grupo de investigación en THz de la USAL. La naturaleza del trabajo es esencialmente experimental y el estudiante trabajará directamente con el sistema y participará en la puesta en marcha de un nuevo subsistema de purgado para incrementar la sensibilidad. A partir de medidas de transmisión en el rango 0.2-2THz se realizarán medidas que permitan extraer parámetros claves del material como la conductividad, la constante dieléctrica y el índice de refracción. Se estudiarán materiales semiconductores básicos (GaAs y Si) y bidimensionales como grafeno mono- y bi-capa fabricado en la Sala Limpia de Nanotecnología de la USAL y de otros fabricantes..</p> <p>El trabajo experimental se realizará en el Laboratorio de Terahercios de la USAL (Edificio de I+D+i).</p>
8.	ESTUDIO DE ESQUEMAS ÓPTICOS PARA MANIPULAR LA INFORMACIÓN CUÁNTICA	LUIS PLAJA RUSTEIN CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA.	Durante los últimos años el desarrollo del láser ha abierto la posibilidad de usar dispositivos ópticos en distintas disciplinas de la Física. En este trabajo de fin de grado proponemos realizar un estudio bibliográfico para estudiar una introducción a los temas de criptografía, computación y correlación cuánticas desde el punto de vista de la Óptica. Se espera que el estudiante tenga asimilados conceptos avanzados de Óptica, Óptica cuántica, Fotónica y Física cuántica que le permitan entender y comprender los temas propuestos.

TRABAJOS DE FIN DE GRADO OFERTADOS -GRADO EN FÍSICA- CURSO 2017-18

9.	ANÁLISIS NUMÉRICO DE PROBLEMAS ELECTROMAGNÉTICOS	VÍCTOR RAPOSO FUNCIA EDUARDO MARTÍNEZ VECINO	<p>En el ámbito del Electromagnetismo, al igual que en muchas otras ramas de la Física, las situaciones o problemas que pueden describirse desde un punto de vista analítico es limitado. El problema fundamental de la Electroestática es calcular el campo eléctrico generado por una distribución de carga en reposo. En Magnetostática, la cuestión es obtener el campo magnético de una distribución de corrientes estacionarias. En ambos contextos, los problemas con solución analítica se limitan a casos de geometrías sencillas como esferas, cilindros, planos, líneas rectas o circunferencias. La resolución de estos problemas suele abordarse haciendo uso de las leyes de Coulomb y Biot-Savart que, junto con el principio de superposición, permiten calcular los campos, o al menos deducir su dirección y su dependencia, para después usar de las leyes de Gauss ó de Ampere [1].</p> <p>Aunque las herramientas que se utilizarán en este trabajo son aplicables a muchas otras ramas de la Física, aquí abordaremos algunos problemas electromagnéticos desde un punto de vista numérico. Se resolverán las ecuaciones de Poisson y Laplace para los potenciales escalar y vector junto con las correspondientes condiciones de frontera. Se usará el método de los elementos finitos del que ya dispone Mathematica™ [2]. Por tanto, el énfasis del trabajo se centrará en describir la solución de algunos problemas y en analizar el rango de validez de posibles soluciones analíticas o aproximadas.</p>
10	ESTUDIO DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE TRANSISTORES DE GRAFENO MEDIANTE MODELOS COMPACTOS DESCRITOS CON VERILOG A	RAÚL RENGEL ESTÉVEZ	<p>El desarrollo de la industria microelectrónica requiere de modelos de dispositivos que puedan ser incorporados de manera eficaz en las herramientas de diseño de circuitos integrados. Con este fin, el uso de modelos compactos ha tenido un gran éxito, pero a costa de una implementación complicada en los simuladores más habituales. El desarrollo de lenguajes hardware como Verilog A ha facilitado notablemente esta tarea, encontrándose a disposición de la comunidad numerosos modelos para distintos tipos de dispositivos. En este trabajo se propone el uso de un modelo compacto en Verilog A combinado con un simulador circuital para evaluar la influencia de diversos parámetros en la respuesta eléctrica de transistores de grafeno.</p>
11	MICROSCOPIA ÓPTICA. FUNDAMENTOS, TÉCNICAS AVANZADAS Y APLICACIONES	JAVIER RODRÍGUEZ VÁZQUEZ DE ALDANA.	<p>Una de las herramientas más versátiles en infinidad de ámbitos científicos y tecnológicos es el microscopio óptico, desde su versión más básica construida con dos lentes, a los equipos más complejos que mejoran enormemente la calidad de imagen y sus posibles aplicaciones. En este trabajo se propone un estudio bibliográfico de las principales técnicas de microscopía óptica utilizadas en distintos ámbitos científicos y técnicos. Se trata de hacer una revisión de los fundamentos de los microscopios ópticos, las distintas configuraciones que pueden utilizarse para su diseño, así como las técnicas de iluminación y de contraste más habituales en función de la naturaleza de la muestra a observar (muestra biológica, sólido opaco, transparente...) Se requieren conocimientos básicos de óptica instrumental y de óptica geométrica de la titulación.</p>
12	TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN TEMPORAL DE PULSOS LÁSER ULTRACORTOS	JULIO SAN ROMÁN ÁLVAREZ DE LARA ÍÑIGO JUAN SOLA LARRAÑAGA.	<p>El trabajo consistirá en realizar una revisión bibliográfica de diferentes técnicas de caracterización temporal de pulsos láser ultracortos. Se propondrá al estudiante comenzar con una recopilación de bibliografía sobre el tema, para su posterior lectura y comprensión. El trabajo deberá incluir tanto técnicas básicas que no son capaces de dar una información completa de la estructura temporal del pulso, como técnicas más avanzadas con las que se recupera tanto la intensidad como su fase del pulso.</p>
13	INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL MICROMAGNETISMO: MODELIZACIÓN DE NANOESTRUCTURAS MAGNÉTICAS DE INTERÉS TECNOLÓGICO.	LUIS TORRES RINCÓN	<p>El objetivo del trabajo es familiarizar al alumno con el modelado de nanoestructuras compuestas por materiales magnéticos y realizar simulaciones de sistemas de interés tecnológico. Partiendo de los conocimientos de electromagnetismo del alumno se le introducirá en los fundamentos de la teoría del micromagnetismo computacional, así como en la utilización de simuladores micromagnéticos de cálculo en paralelo a nivel de usuario.</p>

TRABAJOS DE FIN DE GRADO OFERTADOS -GRADO EN FÍSICA- CURSO 2017-18

			Se realizarán simulaciones de alguno de los siguientes sistemas: Memorias magnéticas de acceso aleatorio (MRAM), válvulas de spin, nano-osciladores, sensores de magneto-resistencia gigante para biotecnología, sensores de magneto-resistencia por efecto túnel, interacción de ondas de spin con paredes de dominio.
14	INTERACCIÓN MATERIA-ENERGÍA OSCURAS Y EL PROBLEMA DE LA COINCIDENCIA.	FERNANDO ATRIO BARANDELA	<p>La densidades de materia (ρ) y energía oscuras (ρ_{de}) varían de forma muy diferente con el tiempo. En términos del corrimiento al rojo, $\rho \propto (1+z)^3$ y $\rho_{de} = \text{const}$ y sin embargo el valor de estas magnitudes hoy es muy similar: $\rho_{de}/\rho \approx 2$. Si las condiciones iniciales del Universo estaban fijadas en la escala de Planck, en ese momento $\rho_{de}/\rho \approx 10^{-90}$, esto es, el valor debe ajustar unos noventa órdenes de magnitud.</p> <p>Una propuesta para solucionar este problema de coincidencia es suponer la existencia de una interacción entre materia y energía oscuras. Calcularemos la evolución de los principales observables cosmológicos para distintos tipos de interacción materia y radiación y compararemos la evolución predicha con las observaciones de: (1) distancias de luminosidad obtenidas utilizando supernovae, (2) distancias angulares a partir de oscilaciones acústicas de bariones y (3) medidas del factor de Hubble a distintos redshifts.</p>
15	EMPUJE POR CURVATURA Y CONDICIONES DE ENERGÍA.	MARC MARS LLORET	<p>En 1994 M. Alcubierre ideó un tipo de curvatura espacio-temporal que permite viajar entre dos puntos distantes en tan poco tiempo como se desee, en particular a velocidad mayor que la de la luz, medida ésta con respecto a observadores externos a la modificación espacio-temporal. Esta construcción fue bautizada como "warp drive" o "empuje por curvatura" y requiere de propiedades exóticas para la materia que genera el campo gravitatorio. En particular se deben violar las llamadas condiciones de energía débiles. El objetivo del trabajo será comprender la construcción de Alcubierre, su relación con la violación de las condiciones de energía y la existencia de horizontes alrededor de la nave, así como las limitaciones prácticas que todo ello supone para convertir este método de transporte en viable.</p>
16	DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL QUARK CHARM MEDIANTE REGLAS DE SUMA	VICENT MATEU BARREDA	<p>Los quarks son las únicas partículas fundamentales afectadas por las interacciones fuertes, responsables a su vez de la cohesión del núcleo. Estas interacciones, conocidas en jerga moderna como cromodinámica cuántica o QCD (la versión en color de las interacciones electromagnéticas), tienen la peculiaridad de volverse más intensas a bajas energías, lo que provoca el confinamiento de los quarks en hadrones (partículas sin color compuestas de objetos coloreados). Esto es debido a que la partícula mediadora, el gluón, es a su vez portadora de color. Una de las consecuencias del confinamiento es que la masa de los quarks no es un observable físico, sino un parámetro de la densidad Lagrangiana de QCD, sujeta pues al programa de renormalización. Esto implica que la masa debe ser definida, y puede depender de la escala de renormalización. Al no ser la masa de un quark un observable físico, no se pueden hacer medidas directas (como por ejemplo se haría con un electrón), sino que se debe encontrar un observable que dependa fuertemente de esta.</p> <p>El quark charm es, junto con el bottom y el top, un quark pesado. Entendemos por quark pesado aquel cuya masa es superior a la escala no perturbativa de QCD (alrededor de 250 MeV), lo que permite el uso de teoría de perturbaciones para calcular algunos observables. Conocer con precisión la masa del quark es de vital importancia para comprobar la validez del Modelo Estándar en la frontera de la precisión. Por ejemplo, las desintegraciones raras de kaones o mesones B dependen fuertemente del valor de la masa del charm, así como la vida media del bosón de Higgs.</p> <p>Uno de los métodos más precisos para determinar la masa del quark charm es mediante el uso de Reglas de Suma. En este método se explota la dualidad quark-hadron para comparar cálculos perturbativos (en términos de quarks y gluones, también denominados conjuntamente "partones") con observables experimentales (que miden hadrones). Los observables a calcular son momentos (integrales con una cierta función peso) de la</p>



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



800 AÑOS

1218 - 2018

TRABAJOS DE FIN DE GRADO OFERTADOS -GRADO EN FÍSICA- CURSO 2017-18

			<p>función R-ratio, esto es, de la probabilidad de obtener un quark charm respecto a la de obtener un muon en una colisión electrón-positrón. Hasta ahora solamente se ha aplicado este método, tanto para el quark charm como para el bottom, a un solo momento.</p> <p>En este trabajo se propone al alumno determinar la masa del quark charm (y la del bottom si el tiempo lo permite) comparando las predicciones teóricas a más de un momento simultáneamente. Para esto se tendrá que construir una función chi-cuadrado que tenga en cuenta las correlaciones, tanto teóricas (no conocidas) como experimentales (conocidas) entre varios momentos. El resultado esperado es una reducción sustancial de la incertidumbre en la masa del quark pesado.</p> <p>Este trabajo está relacionado con las siguientes asignaturas: Física Nuclear y de Partículas, Física de Partículas, Física Cuántica I, Física Cuántica II, Mecánica Cuántica y Mecánica Cuántica Avanzada.</p>
17	EL MODELO SIGMA. THE SIGMA MODEL	TERESA FERNÁNDEZ CARAMÉS	<p>El carácter confinante de las interacciones fuertes provoca que a energías bajas los cálculos perturbativos en términos de quarks y gluones sean imposibles. A bajas energías el confinamiento se realiza con la aparición de 3 mesones muy ligeros, los piones, y otras mesones extraños más pesados: los kaones y la eta, identificados con los Bosones de Goldstone asociados a la ruptura espontánea de la simetría quiral. Este carácter Goldstone constriñe fuertemente el modo en el que estas partículas interaccionan entre sí, lo que permite construir Lagrangianos efectivos en potencias de los momentos y las masas.</p> <p>En este trabajo estudiaremos el modelo Sigma, una realización lineal del teorema de Goldstone, tanto para dos quarks ligeros (up y down) como para tres (up, down y strange). El estudiante debe estudiar y desarrollar distintas parametrizaciones de los campos de Goldstone: lineal, exponencial y raíz. Usando las ecuaciones del movimiento se integrarán funcionalmente los campos Sigma para obtener el modelo sigma no lineal.</p>
18	EL MODELO ESTÁNDAR Y SUS EXTENSIONES	VICENT MATEU BARREDA	<p>El Modelo Estándar de Glashow, Salam y Weinberg (abreviadamente SM), es la teoría que gobierna el mundo (exceptuando la fuerza gravitatoria, cuya cuantización se sigue resistiendo a los físicos teóricos). La densidad Lagrangiana del SM es la fórmula más predictiva de cuantas existen, proporcionando resultados correctos en un rango sorprendentemente amplio de energías: desde desintegraciones débiles de Hadrones ligeros hasta la producción del Bosón de Higgs en el Large Hadron Collider. Sin embargo existen evidencias de que este modelo no puede ser la última respuesta: las masas de los neutrinos, la asimetría materia-antimateria, la existencia de materia oscura, etc... Este modelo se basa en el principio Gauge. La receta es sencilla: se asocia a cada interacción fundamental un álgebra de Lie, y se asume que el Lagrangiano debe permanecer invariante bajo transformaciones locales de estos grupos. La consecuencia de este requerimiento es la existencia de partículas mediadoras de espín uno, los bosones de gauge: tantos como generadores tenga el álgebra de Lie. Adicionalmente la teoría contiene partículas de espín 1/2, los llamados constituyentes fundamentales.</p> <p>Sin embargo esta bonita construcción teórica fallaría estrepitosamente sin la última pieza del puzzle, el Bosón de Higgs, recientemente descubierto en el LHC. Sin ésta, todas las partículas del Modelo Estándar carecerían de masa, contraviniendo la evidencia experimental. El Higgs provoca una ruptura espontánea de la simetría electrodébil del modelo Estándar, permitiendo que todos los fermiones (partículas de espín 1/2) a excepción de los neutrinos, y tres de los botones mediadores gauge, tengan masa.</p> <p>En este trabajo se derivará el Modelo Estándar desde sus cimientos, partiendo de las simetrías y llegando a la forma final del Lagrangiano. Se estudiará la cancelación de las anomalías axiales, fundamental para que el modelo sea renormalizable. Se derivarán las reglas de Feynman y las matrices de mezcla de los quarks. Finalmente, si el tiempo lo permite, se estudiarán extensiones del Modelo Estándar, tales como el two-Higgs double model, el triplet-Higgs model, supersimetría, o teorías de gran unificación, y se estudiarán sus consecuencias teóricas y fenomenológicas. Este trabajo está relacionado con las siguientes asignaturas: Física</p>



VNIVERSIDAD
SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



800 AÑOS

1218 - 2018

TRABAJOS DE FIN DE GRADO OFERTADOS -GRADO EN FÍSICA- CURSO 2017-18

			Nuclear y de Partículas, Física de Partículas, Física Cuántica I, Física Cuántica II, Mecánica Cuántica y Mecánica Cuántica Avanzada.
19	INTEGRABILIDAD Y SIMETRÍAS DE DIVERSOS PROBLEMAS CLÁSICOS NO LINEALES EN MECÁNICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS	PILAR GARCÍA ESTÉVEZ	<p>Hay diversos problemas clásicos en mecánica que usualmente se abordan siempre mediante una aproximación lineal pero que durante los estudios de grado nunca se llegan a resolver de forma completa. Nos referimos a problemas en principio tan habituales como el péndulo o el sólido rígido con un punto fijo. Algo similar ocurre en el estudio de fluidos clásicos que se suelen abordar aproximándolos a la ecuación de ondas. Lo que se propone en este trabajo es analizar diversos sistemas no lineales tanto en mecánica como en física de fluidos mediante técnicas exactas: Dichas técnicas serán básicamente</p> <p>a) Estudio de la integrabilidad entendida como univaluación en las condiciones iniciales</p> <p>b) Integración mediante funciones elípticas</p> <p>c) Determinación de las simetrías de Lie puntuales</p>
20	PROPIEDADES DE HADRONES EN MODELOS DE QUARKS CONSTITUYENTES	FRANCISCO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ	<p>La descripción de las propiedades de baja energía de los hadrones parece sugerir que los quarks que los constituyen tiene una masa efectiva del orden de 300 MeV. Así los momentos magnéticos del proton y del neutrón pueden calcularse suponiendo que los tres quarks que los forma se comportan como partículas no relativistas con ese orden de masas. Modernamente se saben que la aparición de esa masa puede explicarse como consecuencia de la rotura a bajas energías de la simetría quiral del lagrangiano de QCD. Basado en estas ideas uno de los modelos más fructíferos en la descripción de las propiedades de los hadrones es el llamado modelo de quarks constituyentes en el cual se supone que los bariones (mesones) están formados por tres quarks (un quark y un antiquark) con masa ,que interactúan por medio de un potencial . Este potencial tiene típicamente varios términos como son el potencial de confinamiento, el potencial de intercambio de un gluon, y el potencial que se genera como consecuencia de la ruptura de la simetría quiral.</p> <p>El modelo ha sido aplicado desde hace más de 30 años a la descripción de las propiedades de los hadrones y las interacciones entre hadrones [1]</p> <p>En el modelo la descripción de los mesones es sencilla pues basta resolver la ecuación de Schrödinger para dos partículas. En el caso de los bariones el problema se complica un poco más pues es necesario resolver un problema de tres cuerpos. Entre los distintos métodos para abordar este problema uno que suele dar buen resultado es el denominado Gaussian Expansion Method [2] en el que la ecuación de Schrödinger se resuelve por el método variacional utilizando un desarrollo en gaussianas. Aunque el procedimiento es abarcable desde un punto de vista numérico para muchas aplicaciones los quarks dentro de los bariones suelen describirse mediante funciones de onda gaussianas ajustando el parámetro de la misma a alguna propiedad conocida.</p> <p>En los últimos años han aparecido un gran número de resultados experimentales que ponen de manifiesto que es necesario ir más allá de la descripción elemental que planteamos en párrafos anteriores. Así ha aparecido resonancias que parecen tener una estructura de cinco quarks (o meson-barion) o incluso algunas formadas por un quark un antiquark y u gluon (mesones híbrido). En la mayoría de los cálculos que se han realizado hasta ahora los bariones son tratados en la aproximación gaussiana aunque la precisión de las medidas ya exigen ir mas allá de esta aproximación y plantearse la resolución del problema de tres cuerpos.</p> <p>En este trabajo se propone estudiar un método adecuado para la resolución del problema de tres quarks y comparar los resultados con algunos de los cálculos que se han realizado con la aproximación de oscilador armónico También puede aplicarse al estudio de diversas propiedades tales como los factores de forma o las anchuras de desintegración.</p>



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



800 AÑOS

1218 - 2018

TRABAJOS DE FIN DE GRADO OFERTADOS -GRADO EN FÍSICA- CURSO 2017-18

			El trabajo estaría relacionado con las siguientes asignaturas: Física Cuántica I y II, Mecánica Cuántica, Mecánica Cuántica Avanzada , Física Nuclear y de Partículas , Física de Partículas y Física Computacional
21	DESCARGAS ELÉCTRICAS Y CLIMA.	LUIS RIVAS SORIANO	La importancia de las descargas eléctricas en la atmósfera (rayos) en los estudios climáticos es cada vez más reconocida. Las tormentas juegan un papel importante en la redistribución global de agua, que es un mediador clave de la radiación tanto de onda corta como larga. La flotabilidad de las nubes (inestabilidad vertical de la atmósfera), que la responsable de la convección (y por tanto de la separación de cargas) es el resultado de diferencias de temperatura del orden de sólo 1°C. En este trabajo se trata de hacer una revisión que incluya aspectos como: la relación entre rayos y precipitación en la circulación general de la atmósfera la manifestación de las “chimeneas” tropicales en la actividad eléctrica de la atmósfera, la posible inclusión de las tormentas y los rayos dentro de los extremos climáticos, la conexión entre el vapor de agua en la alta troposfera y las descargas eléctricas, el papel del aerosol atmosférico en la precipitación y los procesos de electrificación, la climatología regional de rayos y, por último, la cuestión de las variaciones de largo plazo.